

葡萄糖（Glucose）含量（己糖激酶法）检测试剂盒说明书

（货号：BP10327F 紫外法 48 样 有效期：3 个月）

一、产品简介：

葡萄糖 (C₆H₁₂O₆)，是产生能量分子ATP的主要来源。本试剂盒提供一种定量、快速、简单、灵敏的检测方法，葡萄糖在己糖激酶等酶复合物作用下，使NADPH的量不断增加，通过检测340nm下该物质的增加量，进而计算得到葡萄糖含量。

二、试剂盒组分与配制：

试剂名称	规格	保存要求	备注
试剂一	粉剂 1 支	-20℃保存	1. 临用前 8000g 4° C 离心 2min 使试剂落入管底（可手动甩一甩）； 2. 使粉剂落入底部，再加 1.4mL 蒸馏水备用； 3. 保存周期与试剂盒有效期相同。
试剂二	35mL 液体×1 瓶	4℃保存	
试剂三	粉剂 1 支	-20℃保存	1. 临用前 8000g 4° C 离心 2min 使试剂落入管底（可手动甩一甩）； 2. 加入 1.4mL 蒸馏水备用； 3. 保存周期与试剂盒有效期相同。

三、所需仪器和用品：

研钵（匀浆机）、冰盒（制冰机）、台式离心机、可调式移液枪、水浴锅（烘箱、培养箱、金属浴）、1ml 比色皿、离心管、紫外分光光度计、蒸馏水（去离子水、超纯水均可）。

四、指标测定：

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定，了解本批样品情况，熟悉实验流程，避免实验样本和试剂浪费！

1、样本制备：

- ① 组织样本：0.1g 组织样本（水分充足的样本建议取 0.2g 左右），加 1mL 的蒸馏水研磨，粗提液全部转移到 EP 管中，12000rpm，常温离心 10min，上清液待测。注：若组织样本蛋白含量很高，可先进行脱蛋白处理。

【注】：做实验前可以选取几个样本，找出适合本次检测样本的稀释倍数 D，果实样本含糖量较高，可稀释 20-40 倍；叶片样本可稀释 2-5 倍。

- ② 细胞/菌类样本：先收集细胞或细菌到离心管内，离心弃上清；取 500 万细菌或细胞加入 1mL 蒸馏水；冰浴超声波破碎细菌或细胞（冰浴，功率 20% 或 200W，超声 3S，间隔 10S，重复 30 次）；12000rpm，常温离心 10min，取上清液待测。

【注】：也可按照细菌或细胞数量（10⁴ 个）：提取液体积（mL）为 500~1000：1 的比例进行提取。

- ③ 液体样品：近似中性的澄清液体样本可直接检测；若为酸性样本则需先用 NaOH(2M) 调 PH 值约 7.4，然后室温静置 30min，取澄清液体直接检测。

【注】可选取几个样本，进行不同倍数的稀释，选取适合本次样本的稀释倍数 D。

2、上机检测：

- ① 紫外分光光度计预热 30min，设置温度在 25℃，设定波长到 340nm，蒸馏水调零。

② 在 1mL 石英比色皿中依次加入：

试剂名称 (μL)	测定管	空白管（仅做一次）
样本	25	
试剂一	25	25
试剂二	625	625
混匀，5min后于340nm处读取各管的A1值		
试剂三	25	25
混匀，反应20min于340nm处读取各管的A2值（若A值继续增加，需延长反应时间，直至2分钟内的吸光值保持不变）， $\Delta A = (A2 - A1)$ 测定-(A2-A1)空白。		

【注】1.检测反应20min后是否反应完全，在准备读值时可改用时间扫描3min，间隔1min，依此判读反应是否完全。然后再读取各测定管的A值。

2.若A2大于1.5，可以适当减少样本量（如10 μL ，则试剂二相应增加），

3.若 ΔA 的差值较小，可增加样本量：如50 μL ，则试剂二相应减少。

五、结果计算：

1、按照质量计算：

$$\text{葡萄糖含量}(\text{mg/g 鲜重}) = [\Delta A \div (\epsilon \times d) \times V2 \times Mr \times 10^3] \div (W \times V1 \div V) \times D = 0.8 \times \Delta A \div W \times D$$

2、按照细胞数量计算：

$$\text{葡萄糖含量}(\mu\text{g}/10^4 \text{cell}) = [\Delta A \div (\epsilon \times d) \times V2 \times Mr \times 10^6] \div (500 \times V1 \div V) \times D = 800.7 \times \Delta A \div 500 \times D$$

3、按照体积计算：

$$\text{葡萄糖含量}(\text{mg/mL}) = [\Delta A \div (\epsilon \times d) \times V2 \times Mr \times 10^3] \div V1 \times D = 0.8 \times \Delta A \times D$$

4、按照蛋白浓度计算：

$$\text{葡萄糖含量}(\text{mg/mg prot}) = [\Delta A \div (\epsilon \times d) \times V2 \times Mr \times 10^3] \div (Cpr \times V1 \div V) \times D = 0.8 \times \Delta A \div Cpr \times D$$

ϵ ---NADPH 的摩尔消光系数， $6.3 \times 10^3 \text{ L/mol/cm}$ ；

d ---光径，1cm；

V ---加入提取液体积，1mL；

$V1$ ---加入样本体积，0.025mL； $V2$ ---反应

总体积， $7 \times 10^4 \text{ L}$ ；

Mr ---葡萄糖分子量，180.16；

W ---样本鲜重，g；

500-细胞数量，万；

D ---稀释倍数，未稀释即为1；

Cpr ---蛋白浓度（mg/mL）；建议使用本公司的BCA蛋白含量检测试剂盒。